

Antécédents d'événements marquants jusqu'à ce jour :

Pour chaque signe, cotez :

Son intensité de 0 à 4 :

0 = absent ; 1 = faible ; 2 = modéré ; 3 = fort ; 4 = insupportable

Sa fréquence : E = épisodique ou F = fréquent

Sa périodicité : P = permanent ou R = récurrent (revenant de façon intermittente plus ou moins régulièrement)

Questionnaire

Signes généraux	Intensité 0 à 4	Fréquence E ou F	Périodicité P ou R
Fatigue anormale			
Amaigrissement inexpliqué			
Prise de poids inexpliquée			
Poussées de fièvre inexpliquées			
Sueurs nocturnes			
Adénopathies (ganglions)			
Signes cutanés	Intensité 0 à 4	Fréquence E ou F	Périodicité P ou R
Erythèmes migrants secondaires ou chroniques (taches rouges en anneau, centrifuges, à centre plus clair). Les érythèmes migrants chroniques peuvent prendre une couleur violacée, chamois ou blanchâtre.			
Douleur sur un point de piqûre de tique			
Eruptions cutanées			
Démangeaisons			
Allergies			
Syndrome de Pick-Herxheimer (acrodermatite chronique atrophiante) ou « syndrome de la peau parcheminée » ou « syndrome de l'écorché ». Peau fine et cartonnée ou plissée devenant transparente et laissant voir les veines, avec possibles varicosités en étoile autour d'anciens points de piqûre de tique.			
Lymphocytome borrélien (boule rouge sur le lobe de l'oreille, le mamelon ou le scrotum)			
Perte anormale de cheveux			

Signes neurologiques	Intensité 0 à 4	Fréquence E ou F	Périodicité P ou R
Maux de tête			
Troubles visuels. Précisez :			
Troubles auditifs, acouphènes. Précisez :			
Troubles de l'équilibre, vertiges			
Troubles de la concentration, brouillard cérébral			
Troubles de la mémoire			
Désorientation dans le temps ou l'espace			
Excitation anormale			
Anxiété			
Dépression			
Insomnies			
Hypersomnies			
Troubles du langage			
Troubles de l'écriture			
Troubles de déglutition			
Tremblements			
Fourmillements, engourdissements			
Névralgies (dont sciatique)			
Sensation de décharges électriques			
Douleurs fulgurantes			
Paralysie faciale			
Autres paralysies ou faiblesses musculaires			
Lâchage d'objets			
Mouvements involontaires			
Sensations de brûlures sous la peau			
Signes cardiaques et vasculaires	Intensité 0 à 4	Fréquence E ou F	Périodicité P ou R
Douleurs thoraciques dans la région du cœur			
Palpitations, extrasystoles			
Tachycardie prouvée			
Bradycardie (pouls lent)			
Souffle au cœur connu			
Péricardite			
Hypertension artérielle			
Hypotension artérielle/hypotension orthostatique			
Insuffisance veineuse /varices			
Hémorroïdes			

Signes musculo-squelettiques ou articulaires	Intensité 0 à 4	Fréquence E ou F	Périodicité P ou R
Douleurs musculaires fixées au même endroit			
Douleurs musculaires qui changent de place			
Douleurs articulaires fixées au même endroit			
Douleurs articulaires qui changent de place			
Arthrite (gonflement de l'articulation)			
Douleurs cervicales ou dorso-lombaires			
Fasciculations/tressautements musculaires			
Tendinopathies/tendinites			
Douleurs osseuses			
Douleurs dans la journée			
Douleurs la nuit			
Autres signes	Intensité 0 à 4	Fréquence E ou F	Périodicité P ou R
Aphtes			
Douleurs du pharynx (gorge)			
Douleurs dentaires			
Gingivite, parodontite/dents déchaussées			
Mycoses (incluant candidoses)			
Troubles gynécologiques			
Troubles urinaires inexplicables			
Signes respiratoires (toux, essoufflement)			
Douleurs abdominales			
Troubles digestifs			
Troubles thyroïdiens			